


# 口 腔 外 科 常 用 處 方

—— 洪 棟 樑 ——



## 一、Sulfa-drugs 的處方

Sulfa-drugs 可分為長期性和易溶性等兩種。前者適用於重症，而後者可用於輕症。

### (1) 長期性 Sulfa-drugs 的處方

RP. (SMP)  
Sulfamethoxypridazine 2.0  
3 Tages dosis zwei pulvern ersteus und ein pulver alle 24 stunden zu nehrnen

(三日份，首次服用2包，以後每24小時服用1包)因排泄較遲，故血中濃度可保持較久。  
商品名：Derakin (武田)，Pyridazine (名糖) 首次份量1g，嗣後每24小時，則每日一次服用0.5g比SMP更能保持長期藥效。

RP. (SDM)  
Sulfadimethoxine 2.0  
(用法與SMP相同)

商品名：Omnibon (山之內) Sulxin (中外) Abcidol (第一) Binoxin (鹽野義) Dimethoxin (三共)

RP. (SFP)  
Sulfaphenazole 4.0  
(用法與SMP相同)

商品名：Median (大日本)

RP. (SIS)  
Sulfisomezole 7.0  
3 Tages dosis zwei pulvern ersteus und ein pulver alle 12 stunden zu nehrnen

商品名：Sinomin (鹽野義) 首次服用2g，嗣後每12小時服用1g。  
(2) 易溶性 Sulfa-drugs 的處方

RP. (SIX)  
Sulfithoxazole 6.0  
Auf 4 × tägl z. n.  
(一日份，分為4次服用)

較易溶解於體液內，無尿路結石等副作用。  
商品名：Thiazin (山之內) Salfazin (鹽野義) Oxazin (三共)

用法：1日量4~6g，每6小時服用。

RP. (sIM)  
Sulfithomizine 6.0  
Auf 4 × tägl z. z.

商品名：Domian (大日本) Erycon (第一) Elkosin (武田, Ciba) (3) 簡易處方

RP. Homosulfamin 6.0 4 × (1日份)  
RP. Sulfadiazine 6.0 4 × (1日份)  
RP. Salcon 6.0 4 × (1日份)

Homosulfamin 又稱 Marfanil。對好氣或嫌氣菌均有效的混合感染用劑。血中濃度較低，而排泄過快，因此藥效稍差。常用粉末撒佈於局部，或以5~10%溶液沖洗化膿瘡。

Sulfadiazine (武田) Diazine (中外) 可謂已屬於古董品。甚快被腸管吸收，但排泄於尿中的速度過快。

Salcon亦可謂過時藥劑。100g中含有 Sulfathiazol 37 Sulfadiazine 37 Sulfamelazine 26g。此種配合以期提高血中濃度，而避免結石等副作用

[註] Sulfa-drugs不可與酵母劑配合。因 Par amino安息香酸可減低其藥效。原來 Sulfa-drugs是拮抗細菌體內的促進發育物質 Par amino安息香酸而發揮其藥效的。

Sulfa-drugs 服用後不可曬太陽過久。因皮膚對光線有過敏反應而發疹。

## 二、Antibiotic agents 的處方

RP. Penicillin V Tab.  
800,000 I. u.  
Auf 4 × tagl z. n.

RP. Pyrimidin-penicillin G pub V Tab.  
800,000 I. u.  
Auf 4 × tägl z. n.

RP. Sigmamycin 0.25  
4 cap.  
Auf 4 × tägl z. n.

RP Erythromycin 0.1  
12 Tab.  
Auf 4 × tägl z. n.

RP. Tetracycline 0.25  
6 cap.  
Auf 6 × tägl z. n.

RP. Tetracyclin 30cc  
Nach Bericht

RP. Chloramphenicol 0.25  
6 Tab.  
Aut. 6 × tägl z. n.

RP. Chloramphenicol Palmitate 30cc  
Nach Bericht

## Oral infection → Antibiotic-drugs

Penicillin V  
(Sincepen, sincillin, Sin-  
cependra)  
Sigmamycin  
Erythromycin  
(Eirotycin)  
Tetracycline  
(Achromycin, Tetracin)

← Gram positive →

|       |       |
|-------|-------|
| 連鎖狀球菌 | 79.7% |
| 葡萄狀球菌 | 10.1% |
| 乳酸桿菌  | 3.6%  |

Chloramphenicol  
(chloromycetin, Paraxin,  
kemicetin)

← Gram negative →

|       |      |
|-------|------|
| 加答兒球菌 | 6.2% |
| 不明的桿菌 | 0.4% |

## 三、Troches 與 Vitamin 的處方

### (1) Troches

RP. Tetracycline Troches 0.0156 Tab.  
Auf tägl

RP. Penicillin Troches 5,000 I. u.  
12 Tab.  
Auf 2 T. D.

RP. Iversal 15 Tab.

RP. Oradol 20 Tab.

RP. Dan-Troches 12 Tab.

### (2) Vitamin

RP. Alinamin 5 mg 6 Tab 3 × (1日份)

RP. Vitamin B<sub>2</sub> 10mg 3 × (1日份)

RP. Vitamin C 300mg 3 × (1日份)

RP. Hicee 1 Tab. 1 × (1日份)

RP. Cinal 3.0 3 × (1日份)

## 四、鎮痛劑的處方

### (1) 可用於 Pirin 體質的處方

RP. (PBC)  
Phenacetin 1.0  
Barbital 0.3  
Caff. 0.2  
Auf tägl n. d. E. z. n.

Barbital 是排泄緩慢的持續性催眠藥。適用於延續性疼痛。商品名是 Beronal (Bayer)

RP.  
Kali Bromid 2.0 臭化Kalium 2.0  
Tr Amara 2.0 苦味丁幾 2.0  
S. S. 8.0 糖 液 8.0  
Ag. Dest 100.0 常 水 100.0  
Auf 3 × tägl 一日三次

Kali Bromide 的主要作用是鎮靜。可抑制大腦皮

質的病性興奮。宜用於手術後。另有鎮癢作用。

RP.  
Euchinin 1.5  
Auf 3 × tägl nach dem Essen z. n.

無苦味。宜用於小兒，但禁用於妊婦。

RP.  
Pyrinazin 1.0  
Auf 3 × tägl nach dem Essen z. n.

解熱作用與 Phenacetin 大約相同，但鎮痛作用稍差。雖其名為 Pyri，但非 Pirin 劑。

### (2) 禁用於 Pirin 體質的處方

RP. (PPC)  
Phenacetin 1.0  
Pyrabital 1.0  
Caff. 0.2  
Auf 3 × tägl n. d. E. z. n.

Pyrabital 是 Aminopirin 與 Barbital 的混合劑。故可發生 Pirin 疹。Grelan (武田) Sedron (三共) 均含有 Pyrabital。

RP.  
Pyrabital 0.3  
Brovalin 0.2  
Phenacetin 0.2  
Auf einmal

Pyrabital 配合 Brovalin 可增強鎮痛作用。

RP. (PPB)  
Pyrabital 0.3  
Phenacetin 0.3  
Bromvalerylurea 0.3  
Auf 1 ×

Bromvalerylurea 可抑制大腦皮質的功能。適用於難眠或神經衰弱症。商品名是 Brovalin (日本新藥) Calmotin (武田)。

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| RP. (APC)                   |     |
| Aspirin                     | 1.0 |
| Phenacetin                  | 1.0 |
| Caff.                       | 0.1 |
| S. L.                       | 0.9 |
| Auf 3 × tägl n. a. E. z. n. |     |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| RP. (PCM)                   |       |
| Pyribital                   | 0.3   |
| Chlorpromazine Hcl          | 0.01  |
| Chlorpheniramin malain acid | 0.002 |
| Auf 1 ×                     |       |

抑制腦幹作用頗強。另有精神安定藥效。Chlorpheniraminmalain acid 是抗 Histamin 劑。對 Pirin 體質有拮抗作用。商品名是 Wintermin (鹽野義) Contomin (武田)。

Aspirin 可銳減副腎的 Vitamin C, 而排泄於尿中甚鉅。因此全身抵抗力減低。故配合 Hicee 較佳。

(3) 簡單處方例

| R P.                | 一片的含 (g)  |            |            |       |           |         | 藥廠   |
|---------------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|---------|------|
|                     | Pyribital | Phenacetin | Aminopirin | Caff. | Antipirin | Aspirin |      |
| 新 Grelan 1×2Tab.    | 0.2       | 0.1        |            | 0.01  |           |         | 武田   |
| 小兒用新 Grelan 1×3Tab. | 0.03      | 0.02       |            | 0.002 |           |         | "    |
| Noblon 1×1Tab.      | 0.15      |            |            |       |           |         | "    |
| Sedes 1×2Tab.       |           | 0.1        | 0.027      | 0.035 |           |         | 鹽野義  |
| Saridon 1×1~2Tab.   |           | 0.25       |            | 0.05  | 0.15      | 0.325   | 日本化成 |
| Zactirin 1×2Tab.    |           |            |            |       |           |         | 萬有   |
| Doloran 1×1~2Tab.   |           |            | 0.15       |       |           |         | 藤澤   |

(a) Grelan 係最基本的鎮痛劑。

(b) Noblon 含有 Chlorpromazine 及 Marein 酸 Chlorphenilamine。Chlorpromazine 可劇增 Pyribital 的鎮痛作用，同時亦有抗休克作用，而 Marein 酸 Chlorphenilamine 的抗 Histamin 性也培增。故對神經症狀極烈的病人或神經過敏症尤有效力。Marein 酸 Chlorphenilamin 實為最強力的抗 Histamin 內服劑。

(c) Sedes 粉末 250mg 中含有 Aethylhexabital, aminopirin 分子化合物 46, Aminopirin 27, Phenacetin 100, Caff. 35。其鎮痛作用約為 Pyribital 的三倍。Sedes 注射液 2cc 中含有鹽酸 Chlorpromazine 20, 鹽酸 Prometasin 6, ethylhexabital-aminopirin 分子化合物 80, Aminopirin 40, 鹽酸 Papaverin 30。藥理實驗的結果，證實本劑 1.5cc 的鎮痛效力等於 Morphine 10mg。鎮靜作用奇佳。對手術時的嘔吐或休克均有效。鹽酸 Chlorpromazine 及鹽酸 Prometasin 均有抗休克或抗嘔吐等中樞作用。Papaverin 對齒

|                    |      |
|--------------------|------|
| RP.                |      |
| Sedes              | 0.5  |
| Chlorpromazine Hce | 0.01 |
| Auf 1 ×            |      |

|            |     |
|------------|-----|
| RP.        |     |
| Sedes      | 0.5 |
| Auf einmal |     |

|              |        |
|--------------|--------|
| RP.          |        |
| Aspirin      | 1.0    |
| phenacetin   | 0.7    |
| Caff.        | 0.2    |
| Alumigel     | 2.0    |
| Hicee        | 1 Tab. |
| Auf 3 × tägl |        |

科的鎮痛作用毫無關連，而對胃、十二指腸潰瘍的疼痛，則對平滑肌的收縮性疼痛有緩解作用。

(d) Saridon 含有最新 Pirin 劑—Isopropil antipirin。另含有 Aril, Isopropilacethoulcid (Seddolmido)。鎮痛效用極快。10分鐘左右即可見效。服用後絕無不適感或疲勞感。最適合於性急的病人。

(e) Zactirin 片的黃色層含有枸橼酸 Aethoheptasin 75mg, 綠色層含有 Acetylsalicyl 酸 325mg。枸橼酸 Aethoheptasin 有甚強的鎮痛作用。配合 Acetylsalicyl 酸能發生協力作用。其鎮痛作用等於 Codein 及 Aspirin 兩者合計的效力。但仍可發生 Pirin 疹。誠可謂美中不足的缺憾。

(f) Doloran 是 Aminopirin 與催眠劑 Allobarbital 50mg 的分子結合劑。在新陳代謝頻繁的新藥界，保持聲譽竟久達 12 年，誠為難能可貴。

(4) 鎮痛劑的副作用

|             | 瘙癢症 | 濕疹 | 沈着色素 | 紫斑 | 紅疹 | 蕁麻疹 | 猩紅熱樣 | 水泡性 | 單純性 |
|-------------|-----|----|------|----|----|-----|------|-----|-----|
| Antipirin   | +   |    | +    | +  | +  | +   |      | +   | +   |
| Aspirin     | +   | +  |      | +  | +  |     |      | +   |     |
| Aminopirin  | +   | +  |      |    |    |     |      |     |     |
| Phenacetin  |     |    |      |    | +  |     |      |     |     |
| Sulfa-drugs | +   |    |      | +  | +  |     |      |     |     |

Antipirin 的副作用最大。Phenacetin 的副作用最小。劇痛時服用 Aminopirin。中等痛時服用 Phenacetin。輕痛時服用 Aspirin。應儘量避用 Antipirin。

五、外敷用法用劑的處方

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| RP. (BUROW)                 |       |
| Pb. Acetate                 | 5.0   |
| Aluminium Kalium Sulfuricum | 1.0   |
| Aq. Dest                    | 500.0 |
| M. F. Fomentum              |       |

Pb. Acetate (醋酸鉛) 液又稱鉛糖水。與蛋白接觸時，即生成蛋白鉛而發生收斂，制泌作用。硫酸 Aluminium 稍有收斂作用。此處方稱為 Burrow's solution。

|                |       |
|----------------|-------|
| RP.            |       |
| Pb. Acetate    | 5.0   |
| Acid Acetate   | qs    |
| Aq. Front ad.  | 500.0 |
| M. F. Fomentum |       |

|                |       |
|----------------|-------|
| RP.            |       |
| Pb. Acetate    | 5.0   |
| Pulv. Almminis | 1.0   |
| Aq. Frontad.   | 500.0 |
| M. F. Fomentum |       |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| RP.                |       |
| Sankyo Cotoplosm   | 250.0 |
| sig. Apply locally |       |

Sankyo Cotoplosm 含有白陶土 37.5%, Extractum Scopoliae 37.0%, Bentnite 9.0%, 大豆油 7.0%, 適量的無水芒硝, 硼酸, Methylum salicylium, 薄荷油等。刺激皮膚反射，發生表在血管的擴張及深部血管的收縮，因而使疾患部的血液循環增旺，消去充血，減輕疼痛。

六、含漱劑的處方

|              |       |
|--------------|-------|
| RP. (BW)     |       |
| Acid Boric   | 10.0  |
| Aq. Dest     | 500.0 |
| M. F. Gargle |       |

|              |       |
|--------------|-------|
| RP. (AW)     |       |
| Acrinol      | 0.05  |
| Aq. Dest     | 500.0 |
| M. F. Gargle |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| RP. (ALW)     |       |
| Pulv Aluminis | 1.5   |
| Aq. Menthol   | 25.0  |
| Aq. Dest      | 500.0 |
| M. F. Gargle  |       |

|              |       |
|--------------|-------|
| RP.          |       |
| Nat. Bicarb  | 10.0  |
| Aq. Dest ad  | 500.0 |
| M. F. Gargle |       |

|              |         |
|--------------|---------|
| RP.          |         |
| Chlorophyl   | 1.0~1.5 |
| Aq. Dest ad  | 500.0   |
| M. F. Gargle |         |

◆ 稿 約 ◆

1. 本刊竭誠歡迎惠稿。
2. 本刊為一綜合性雜誌，凡有關醫學方面之文章：學術論著、譯述、讀書心得、研究報告、生活寫實、傳記、遊記、文藝創作、音樂、藝術、詩歌、散文、小說以及生活照片、漫畫、木刻、幽默短篇等均所歡迎。
3. 文題不拘，長短亦無限制。
4. 來稿請用有格稿紙繕寫清楚（尤其是英文字母）。附圖以黑墨畫於白紙上，譯稿請附原文或註明詳細出處。
5. 來稿請註明真實姓名及通訊處，發表時筆名聽便。本刊對來稿有刪改權，其不願者，請先聲明。
6. 來稿如經採用，當略致薄酬。
7. 來稿請寄本校訓導處轉杏園社收，或逕投本校辦公大樓內之「杏園稿箱」。
8. 請隨時投稿。
9. 本刊公開徵求封面設計。盼有興趣的同學踴躍應徵。