

認識子宮頸癌疫苗

文/婦產部 林于翔 醫師

根據行政院衛生署97年統計，惡性腫瘤已連續二十七年高居十大死因榜首，而子宮頸癌亦高居台灣女性癌症死亡原因的第6位。何謂子宮頸癌呢？顧名思義就是源發於子宮頸上皮細胞的癌症，目前，子宮頸癌是台灣地區女性發生率最高的癌症，根據國健局2007年統計子宮頸癌新增個案為1,749人。

近年來由於政府相關單位的大力宣導「六分鐘護一生·三點不漏」的子抹篩檢宣導，進而使罹患子宮頸癌的死亡率下降了32%。臨床上對於子宮頸病變的篩檢除了傳統的抹片檢查外，更加入了人類乳突病毒(HPV)的篩檢。部分相關數據已顯示可以增加子宮頸病變篩檢的準確度，並可以改善傳統抹片篩檢的高陰性缺點。

由於90%的子宮頸癌都是由HPV病毒感染所導致，目前HPV疫苗已在台灣上市，可視為女性一大福音。接種HPV疫苗不僅可以降低罹患子宮頸癌的機會，更可以預防菜花。子宮頸疫苗為何？期接種條件為何呢？以下透過問答方式為您解開疑惑：

一、四價HPV疫苗是什麼？有什麼用？

四價HPV疫苗是一個肌肉注射針劑疫苗，用來預防下列因感染人類乳突病毒所引起的疾病：1、子宮頸癌及子宮頸癌前期病變。2、外陰癌前期病變。3、陰道炎前期病變。4、生殖器疣（菜花）。

二、哪些人可以接種四價HPV疫苗？

1、建議12歲至26歲的女性可以接種四價HPV疫苗。

2、9至12歲的兒童，請家長與醫師討論決定是否適合接種四價HPV疫苗。

三、哪些人不可以接種四價HPV疫苗？

1、對於四價HPV疫苗的任何一種成分有過敏紀錄，或曾經接種一次四價HPV疫苗有出現過敏的人。

2、懷孕的婦女，不建議接種四價HPV疫苗。

四、有關四價HPV疫苗有哪些重要須知？

1、HPV第16/18形式是最常見的高危險人類乳突病毒，子宮頸癌超過70%是由HPV16/18型所引起的，HPV6/11型是最常見的低危險人類乳突病毒，生殖器疣（菜花）有90%是由HPV6/11型所引起的。

2、四價HPV疫苗用於預防而非治療。

3、四價HPV疫苗的預期效應：降低60%到70%罹患子宮頸癌的風險；降低50%子宮頸癌前期病變；降低90%生殖器疣；及97%人類乳突病毒16/18感染。

4、接種四價HPV疫苗並不能取代常規的子宮頸癌篩檢，接種四價HPV疫苗的女性，仍須接受子宮頸抹片臨床指引，定期接受子宮頸抹片檢查及追蹤。

5、已經罹患子宮頸癌或癌前期的女性，不建議施打四價HPV疫苗。

6、若已經感染了某些型別的人類乳突病毒再接種四價HPV疫苗，無法預防發生因

這些已感染型別所引起的疾病。

7、四價HPV疫苗的妊娠數為B級。接種四價HPV疫苗期間如果懷孕，不須終止懷孕。哺餵母乳期間，可以接受四價HPV疫苗接種。

五、如何接種四價HPV疫苗？

四價HPV疫苗是採用注射的方式施打。

- 1.第一劑量：在您和醫師選定的日期。
- 2.第二劑量：在首次劑量的1-2個月後。
- 3.第三劑量：在首次劑量的6個月後。

六、四價HPV疫苗可能造成的副作用有哪些？

1、最常通報的副作用包括：

- (1) 注射部位痛、腫脹、癢及發紅。
- (2) 發燒。

2、曾經發生呼吸困難（支氣管痙攣）的案例通報，但很少見。

其實除了接種疫苗外，婦女更簡單預防子宮頸癌的辦法是定期做抹片檢查，建議30歲以上婦女，每3年至少接受一次子宮頸抹片檢查，早期發現，早期治療，子宮頸癌早期治癒率可達100%。此外，接受免疫抑制療法的患者、HIV感染者、曾有高風險HPV感染者，則應每年做一次抹片檢查。

本院亦提供免費癌症篩檢福利，此為免掛號費，免篩檢費，歡迎民眾踴躍參加：

★★★免費癌症篩檢福利共有4項，大家要多加利用喔！★★★

癌症種類	篩檢對象	篩檢方式	篩檢頻率
大腸癌	50-69歲民眾	糞便潛血免疫法檢查	每2年1次
乳癌(請先預約)	1.45-69歲女性 2.40-44歲二等親內曾罹患乳癌之高危險群	乳房X光攝影	每2年1次
子宮頸癌	30歲以上婦女	子宮頸抹片檢查	每1年1次
口腔癌	30歲以上吸菸或嚼檳榔民眾	口腔黏膜檢查	每2年1次

受理時間：週一到週五早上 8:00-12:00、下午13:30-17:30

報到處：請攜健保卡 洽詢大慶院區核醫大樓1樓癌症篩檢站

諮詢電話：04-24739595轉32152 王淑盈護理師