

8個症狀顯示你被輻射了

1. 噁心和嘔吐

噁心和嘔吐是典型的輻射病的最早症狀。輻射劑量越多，這些症狀出現越早。受到輻射後一個小時開始嘔吐的人極有可能會死亡。有時放射病起初讓人感覺不好，然後開始感覺好多了。但通常會“潛伏”幾小時，幾天，甚至是接下來的幾個星期裏會伴有新的，更嚴重的症狀。

2. 自發性出血

放射病可引起鼻腔，口腔，牙齦和肛門出血。它可以很容易引起人們的挫傷和內部出血，甚至吐血。這些問題發生的原因是輻射耗盡了體內控制出血的血小板。

3. 出血性腹瀉

輻射“瞄準”體內細胞迅速繁殖，這細胞該行腸道。放射病的原因主要刺激腸壁，嚴重時引起帶血腹瀉。

4. 皮膚脫落

暴露于輻射外的皮膚區域可能會變成水泡，變紅——幾乎像一個嚴重的曬傷。在某些情況下，形成開放性潰瘍，皮膚甚至脫落。有時與放射病起初讓人感覺不好，然後開始感覺好多了。但通常更嚴重的症狀將出現在幾小時，幾天，甚至“潛伏”階段幾個星期。

5. 脫髮

輻射傷害毛囊。因此，人們誰獲得大劑量的輻射往往會在在兩周或三周內持續脫髮。有時，這種脫髮是永久性的。

6. 嚴重疲勞

放射病會導致人感到虛弱和不舒服-幾乎就像有一個嚴重版本的流感。紅血細胞明顯減少，導致貧血並增加了昏厥的危險。

7. 口腔潰瘍

放射病會導致或口可見潰瘍。此外，潰瘍還可能形成在食道，胃和腸。

8. 感染

隨著紅細胞減少，可減少放射性疾病的抗感染的白細胞也減少。因此，細菌，病毒和真菌感染的風險提高。

採取額外的預防措施：


今天或是在未來數天不要走在雨中。

要用雨傘或雨衣，即使它只是一個細雨。

放射性粒子可能會在雨中，這可能會引起灼傷，脫髮，甚至癌症。


最熱門的常識，沒事少照X光或各種掃描。主旨：醫療游離輻射劑量比較圖，這樣大家就應該有概念了吧！！

醫療游離輻射劑量比較圖



行政院原子能委員會 製作

一般游離輻射劑量比較圖



行政院原子能委員會 製作